



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




Роль медицинской сестры в лечебном процессе при сифилисе, врождённом сифилисе

Авторы:

Полетаева Ирина Алексеевна к.м.н., доцент
Крючкова Анна Васильевна к.м.н., доцент
Кондусова Юлия Викторовна к.м.н., доцент
Титкова Мария Сергеевна
студентка 2 курса 2 группы



Сифилис – хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной и сердечно-сосудистой системой (в зависимости от стадии заболевания).





Этиология сифилиса



Возбудитель сифилиса - бледная трепонем - слабоокрашивающийся спиралевидный микроорганизм с 8-14 правильными завитками, одинаковыми по форме и размерам. Размножается бледная трепонема путем поперечного деления на две или большее количество частей.

Пути передачи:

- Половая связь.
- Трансфузионная передача.
- Бытовая передача.
- Заражение плода во время беременности.






Классификация



Первичный сифилис:

С момента появления твёрдого шанкра начинается первичный период заболевания, который продолжается до возникновения на коже и слизистых специфической сыпи.






Вторичный сифилис:

Вторичный сифилис обусловлен преимущественно гематогенной диссеминацией возбудителя в организме больного и проявляется появлением высыпаний на коже и слизистых оболочках.

Данный период заболевания в большинстве случаев начинается через 9-10 недель после заражения.





Третичный сифилис:

Появляются глубокие бугорки, гуммы с деструктивным распадом и последующим рубцеванием





Врожденный сифилис:

Врожденным называется сифилис, который передается будущему ребенку трансплацентарно через кровь матери. Врожденный сифилис бывает ранним и поздним.

К раннему врожденному сифилису относятся сифилис плода, сифилис грудного возраста и сифилис раннего детского возраста. Поздний врожденный сифилис выявляется обычно после 15-16 лет.



Врожденный сифилис




На фото саблевидные голени у ребенка.



На фото диффузная инфильтрация кожи при раннем врожденном сифилисе.



Шанкры





Розеолезно
папулезно
пустулезная сыпь.





Диагностика



Основные методы диагностики:

- Анализ крови и спинномозговой жидкости для выявления специфических и неспецифических маркеров инфекции.
- Микроскопическое изучение кожных образований в качестве дополнительной диагностики.
- Обследование внутренних органов и центральной нервной системы для выявления осложнений болезни.





Лечение сифилиса, врожденного сифилиса



- Доксициклин. Этот антибиотик является отличной альтернативой производным пенициллина.
- Эритромицин, производные тетрациклина и цефалоспорины при обнаружении резистентности бактерий к пенициллину.
- Производные висмута и мышьяка при третичной форме инфекции.





Осложнения сифилиса



Осложнение шанкра

Провал носа





Профилактика сифилиса, врожденного сифилиса



Правила, соблюдение которых позволяет избежать заражения:

1) Защищенный секс. Использование презерватива.

2) Избегание случайных половых связей.

3) Строгая гигиена в случае проживания с человеком,

страдающим от сифилиса.





Заключение

Сифилис – одно из распространённых заболеваний, которое почти каждый год приводит к увеличению больных. Заразиться сифилисом чаще всего можно через половые контакты. Очень редко, когда заболеть можно через предметы обихода. Так же не стоит забывать о возможности заражения через плаценту в период беременности.

Целью сестринского процесса при сифилисе, врожденном сифилисе является поддержание и восстановление независимости пациента в удовлетворении собственных потребностей его организма.



Наиболее распространенными жалобами у опрошенных пациентов с сифилисом были: слабость, повышение температуры тела, сыпь, а также покраснения в области половых органов.

Очень важная роль отводится медицинской сестре в профилактике сифилиса. Медсестра принимает участие в санитарно просветительной работе не только с больными, но и с их родственниками.





Спасибо за внимание!