

Ортодонтическая реабилитация детей, перенесших аденоотомию

Пардаева Мунира Суръатовна

Самаркандский Государственный медицинский университет



Аденоотомия - это хирургическое удаление аденоидов, которые являются скоплением лимфоидной ткани в носоглотке. Удаление аденоидов может быть необходимо при частых инфекциях верхних дыхательных путей, затрудненном дыхании через нос, храпе и др.

Функция аденоидов

Аденоиды играют важную роль в иммунной системе, защищая организм от инфекций.



Ортодонтическая реабилитация после аденоотомии направлена на восстановление нормального прикуса, положения зубов и функции жевательного аппарата.

Правильная реабилитация помогает улучшить качество жизни детей, предотвращая развитие осложнений и повышая самооценку.

Ортодонтические методы лечения



Брекеты-системы

Используются для коррекции положения зубов, исправления прикуса и создания гармоничного профиля лица.



Съемные аппараты

Используются для коррекции прикуса, расширения челюсти, выравнивания зубных рядов и стимуляции правильного роста.



Пластины

Применяются для коррекции легких аномалий, направленного роста челюсти и укрепления зубных рядов.

Этиология нарушений зубочелюстной системы после аденоотомии

1

Изменение дыхания
Ротовое дыхание, которое становится привычным после аденоотомии, оказывает негативное влияние на развитие челюстей.

2

Нарушение мышечного равновесия
Изменения в дыхании вызывают нарушения в работе жевательных мышц, влияя на развитие зубочелюстной системы.

3

Изменения в росте челюстей
Неправильный рост челюстей, связанный с аденоотомией, может привести к развитию различных аномалий прикуса.

Значение комплексного подхода

Сотрудничество специалистов

Ортодонт работает в тесном взаимодействии с отоларингологом, педиатром, логопедом, и другими специалистами.

Индивидуальный подход

Врачи разрабатывают индивидуальную программу лечения, учитывая особенности ребенка, возраст, и тип нарушения.

Психологическая поддержка

Важно создать комфортную атмосферу, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, и спокойно переносил лечение.

Клинические проявления

Изменения окклюзии

У детей, перенесших аденоотомию, часто наблюдается неправильный прикус. Изменения окклюзии могут привести к затруднению жевания.

Изменения формы лица

Дефицит носового дыхания может привести к развитию так называемого "аденоидного лица". Изменение формы лица может привести к психологическим проблемам.

Выводы



Здоровье

Ортодонтическая реабилитация после аденоотомии улучшает здоровье детей, способствует правильному развитию челюстей и зубов.



Качество жизни

Реабилитация повышает качество жизни, устраняя проблемы с дыханием, речью, внешностью и психологическим состоянием.



Эффективность

Комплексный подход, своевременное лечение и сотрудничество с родителями гарантируют успешную реабилитацию.